

熟積算気温によるコンバイン収穫の場合の 刈り取り開始時期の目安



品種 ひとめぼれ
積算温度 1,000℃

アメダス 地点	標高 (m)	出穂期	刈取開始時期 (月/日)		
			平均気温 2℃低い	平均気温 平年並	平均気温 2℃高い
一関市 竹山町	32	7/27	9/9	9/7	9/5
		7/30	9/13	9/10	9/8
		8/2	9/18	9/15	9/12
		8/5	9/22	9/18	9/15
		8/8	9/26	9/22	9/18
千厩町	120	7/27	9/11	9/9	9/7
		7/30	9/16	9/12	9/10
		8/2	9/20	9/17	9/14
		8/5	9/25	9/20	9/17
		8/8	9/29	9/24	9/20

刈り取り適期

- 刈り取り開始時期（「ひとめぼれ」の場合）は、今後の平均気温が平年並の場合は9月7日頃からと予測されます。
- 栽培法や日照時間によりズレが生じる場合があるため、予想される成熟期の2～3日前頃になったら、必ず圃場ごとに籾の熟色（黄化程度）を観察して刈り取り時期を判断してください。
- 生育ムラや倒伏、病害虫の発生等により、成熟時期が大きく異なる部分がある場合は、刈り分けを行い、品質向上を図りましょう。

< 刈り取り適期の目安（ひとめぼれ） >

- コンバイン収穫・機械乾燥体系の場合
穂の85～90%の籾が黄色くなった頃（穂基部の一割程度が緑色）。
→ 青未熟粒等の発生を防止するためです。
- バインダー刈り（自然乾燥）の場合
穂の80～90%の籾が黄色くなった頃。
→ はせ掛け等の乾燥中に籾の黄化が少し進むためです。

（注意）コンバインをトラック等からおろす際は、2人以上で行い
安全に注意しましょう。