

いわて平泉米だより

令和4年9月号

令和4年産水稻の刈り取りが始まります。

○登熟積算気温によるコンバイン収穫の場合の刈り取り開始時期の目安（8/31 現在）

品種 ひとめぼれ
積算温度 1000℃

アメダス地点	標高 (m)	出穂期	刈り取り開始時期 (月/日)		
			平均気温 2℃低い	平均気温 平年並み	平均気温 2℃高い
一関市竹山町	32	7/31	9/12	9/10	9/10
		8/2	9/15	9/13	9/12
		8/4	9/17	9/16	9/14
千厩町	120	7/31	9/14	9/12	9/11
		8/2	9/17	9/15	9/13
		8/4	9/20	9/18	9/16

刈り取り適期の判断 ～収穫時期の留意点～

刈り取り予定日に近づいたら、次の手順で判断しましょう。

○黄化もみ割合のチェック

平均的な大きさの穂を観察し、黄化したもみが1穂もみ数に占める割合を確認します。

刈り取り適期は「黄化もみ割合 80～90%」（80～90%のもみが黄化、10%程度が緑色の状態）です。

○テストもみすりによるチェック

黄化もみ割合が80～90%に達したら、数穂を試しにもみすりしてみましょう。

積算気温による刈り取り適期の判断は、栽培法や日照時間によって前後する場合がありますので、実際の登熟状態を確認してください。