

7月から9月は夏の熱中症等声かけ期間です！

農作業中の熱中症による死亡者が急増しています。

このうち、約85%が7～8月に発生しており、非常に熱中症リスクが高くなっています。

熱中症事故は、周りの人がお互いに気を配り、声を掛け合うことで、防げる可能性があります。

農業は1人作業が多く、熱中症になった際に自分では症状を自覚しにくいことから、熱中症が重篤化しやすい傾向にあります。

また、高温の日は疲れ等により、高所から転落するなどの事故が起きやすいので、注意が必要です。



熱中症対策の3つのポイント



※ 温度やWBGT値を見て 作業を考えよう

- 暑さに応じて、作業内容を調整
- 重い作業は、朝夕の時間帯にずらす、または休憩や給水の回数を増やす
- ※ 人体を外気との熱収支に着目した、熱中症予防を目的とする指標



こまめに休憩を取ろう

- 20分おきを目安に休憩
- 休憩時には水分・塩分補給を（コーヒー・緑茶は避け、水・スポーツ飲料など）
- 日陰や冷房のある場所で体を冷やす



もしもの時の応急処置

- 異常を感じたらすぐ作業を中断し、涼しい場所で衣服を緩めて身体を冷やす
- 意識がもうろうとしている・返答がおかしい場合は、直ちに119（または#7119）へ電話を



その他熱中症対策は農水省HPをご覧ください

一人一人の「大丈夫？」が、命を守ります。
この夏は熱中症による死亡者0を目指しましょう！

県南子牛市場

令和8年6月16日

※単位：円（ただし高値・安値は千円）税込みです。

支 部	雌				去勢				合計		
	頭数	高値	安値	平均価格	頭数	高値	安値	平均価格	頭数	平均価格	前回比(%)
一 関	25	998	670	778,404	13	1,036	400	792,423	38	783,200	92.9%
花 泉	24	871	694	797,179	25	1,051	691	893,112	49	846,124	102.7%
平 泉	4	805	666	729,300	2	964	899	931,150	6	796,583	85.4%
千 厩	12	837	682	768,258	24	1,091	664	854,104	36	825,489	94.9%
藤 沢	3	785	715	742,133	3	899	660	784,667	6	763,400	87.5%
大 東	14	828	693	769,843	13	976	755	896,838	27	830,989	101.0%
東 山	7	827	702	771,571	9	992	867	929,378	16	860,338	102.9%
室 根	3	794	761	779,900	18	993	660	877,556	21	863,605	101.9%
川 崎	5	851	766	811,360	1	882	882	882,200	6	823,167	99.6%
合計・平均	97	998	666	778,664	108	1,091	400	870,793	205	827,200	98.1%

6月市場

最高販売額の血統構成

雌 父：光 福 久
母の父：安 福 久
祖母の父：菊安舞鶴（一関）

去勢 父：福 勝 鶴
母の父：茂 晴 花
祖母の父：安 福 久（千厩）

生産資材ひろば

効果的な 電気柵の設置方法と 害獣対策資材の活用

野生動物による農作物等への被害が増えています。電気柵の基本的な設置方法と注意点をお知らせします。

◆通電の良い場所に設置する

地面の乾いた場所や通電性のない地面（コンクリート・アスファルトなど）の場合動物に電流は流れません。少し田畑の内側に柵を設置するか、トタン板を敷くなど工夫が必要です。



◆傾斜地から離して設置する

柵を飛び越える場合があるので傾斜地から2m程度離して設置しましょう。

◆漏電防止の草刈りをする

草が電線に触れていると電圧が低くなります。バッテリーや電池も早く消耗します。

◆柵のそばのやぶをなくす

やぶは動物の隠れ家になります。柵の外際3m程度の刈り払いを行いましょう。

◆動物の鼻先の高さに電線を張る

動物の体には固い毛があるため、鼻先や肉球などにしか電流は流れません。電線は動物の鼻先の高さに1本張り、潜り抜けないようにさらに下に張る必要があります。

◆地面のくぼみは電線でふさぐ

地面のくぼみは電線を追加するなど隙間を必ずふさぎましょう。

◆定期的に点検し、補修、維持管理を行う

定期的に電圧チェックを行いましょう。落ち枝等で破損していないかも確認します。地形によっては、電流が流れていても地際から侵入している可能性があります。定期的に点検し安全な使用を心掛けましょう。

◆周囲を隙間なく囲う

動物は隙間を探し侵入しようとしします。田畑の周囲をすべて囲うように設置しましょう。

◎害獣対策資材はチラシ等でお知らせしています。最寄りのJA営農経済センターへお問い合わせください。



病害虫対策を徹底し 水稻の出穂に備えましょう

○今後の水管理は、中干しを行った後、間断かんがいを実施しましょう。ここで一気に深水にしてしまうと酸素欠乏となり、根に障害が発生する恐れがあります。（間断かんがいは、1～2日間かん水を行った後、3～4日間落水を行う水管理のことです。）

○7月上旬に葉色の濃い部分を中心に、いもち病が発生していないか確認しましょう。病斑が見られた場合は、直ちにブラシン剤を茎葉散布してください。なお、使用した場合は輝米となりますので、注意してください。

○カメムシ対策のため、7月20日～25日までに再度、畦畔の草刈りを行いましょう。出穂間際に草刈りを行った場合、斑点米カメムシが本田に追い込まれてしまい、かえって被害を悪化させる恐れがあります。

詳しい技術情報は、良質米生産技術情報第4号を参考にしてください。

LINE
公式アカウント



JAのLINE公式アカウントにおいて営農情報を発信します。お友だち追加をお願いします。

和牛枝肉販売成績 令和8年6月

	格付	雌			去勢			上物率 (格付4等級以上)
		枝重(kg)	単価(円)	販売額(円)	枝重(kg)	単価(円)	販売額(円)	
JA いわて 平泉 販売分	5等級	446	2,563	1,143,098	561	2,455	1,377,255	100.0%
	4等級	405	2,275	921,375	648	2,002	1,297,296	
	3等級	—	—	—	—	—	—	

販売頭数 32 頭

※枝重、単価、販売額は平均値

出荷月間最高販売牛 血統紹介



雌の部

花国安福 × 北平安 × 芳悠土井
A5 478kg 2,994円

去勢の部

福之鶴 × 百合茂 × 安福久
A5 650kg 2,723円